

Số: 2207 /YTĐL-KSBT

Đắk Glei, ngày 10 tháng 10 năm 2022

V/v hướng dẫn sử dụng vắc xin Pfizer
dạng hỗn dịch tiêm

Kính gửi: Các bộ phận trực thuộc.

Căn cứ Quyết định số 900/QĐ-VSDTTU ngày 30/9/2022 của Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương về việc phân bổ vắc xin phòng COVID-19 đợt 176.

Căn cứ Công văn 1269/KSBT-BTN ngày 06/10/2022 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Kon Tum về việc hướng dẫn sử dụng vắc xin Pfizer dạng hỗn dịch tiêm. Để thực hành tốt việc sử dụng vắc xin trong chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn huyện Đắk Glei năm 2022, Khoa Kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS - Tư vấn và điều trị nghiện chất hướng dẫn sử dụng vắc xin Pfizer dạng hỗn dịch tiêm, như sau:

1. Thông tin về vắc xin dạng hỗn dịch tiêm

- Vắc xin Comirnaty (Pfizer-BioNTech Covid-19 Vaccine) dạng bào chế hỗn dịch tiêm là vắc xin mRNA COVID-19 do Pfizer- BioNTech sản xuất.

+ **Lọ vắc xin có nắp màu xám**, loại dung dịch tiêm ngay, **không cần pha loãng** trước khi sử dụng, đóng lọ 2,25 ml chứa 6 liều, mỗi liều 0,3ml.

+ Bảo quản +2°C đến +8°C: **Tối đa 10 tuần** kể từ ngày rã đông, lưu ý vắc xin đã rã đông không để đông băng lại.

+ Không lắc lọ vắc xin. Nhẹ nhàng trộn đều bằng cách đảo ngược lọ 10 lần trước khi sử dụng.

- Chỉ định: Vắc xin sử dụng cho người từ 12 tuổi trở lên. Sử dụng vắc xin tiêm liều cơ bản, liều nhắc lại theo hướng dẫn tại Văn bản số 3309/BYT-DP ngày 23/6/2022 của Bộ Y tế.

- Liều lượng, đường tiêm: Tiêm bắp, liều 0,3ml.

- Thực hiện khám sàng lọc và tổ chức buổi tiêm chủng theo các hướng dẫn hiện hành của Bộ Y tế.

Lưu ý:

+ Có thể hoán đổi sử dụng vắc xin Pfizer dạng hỗn dịch tiêm với vắc xin Pfizer hỗn dịch đậm đặc pha tiêm.

+ Nếu lượng vắc xin còn lại trong lọ không đủ liều 0,3 ml, hủy bỏ luôn bơm kim tiêm và vắc xin có trong bơm kim tiêm. **KHÔNG** dồn vắc xin từ nhiều lọ lại với nhau để có được một liều 0,3ml. Lọ vắc xin đã mở chỉ sử dụng trong buổi tiêm chủng.

2. Khoa Kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS - Tư vấn và điều trị nghiện chất phổ biến nội dung, hướng dẫn về cách sử dụng vắc xin Pfizer hỗn dịch tiêm cho các cơ sở tiêm chủng trên địa bàn. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các cơ sở tiêm chủng để kịp thời chấn chỉnh các sai sót trong thực hành tiêm chủng.

3. Đề nghị Trạm Y tế các xã, thị trấn và Phòng khám ĐKKV xã Đăk Môn; nghiên cứu kỹ cách hướng dẫn sử dụng, chỉ định, thông tin vac xin và liều dùng phổ biến cho viên chức trước khi thực hiện tiêm vac xin.

Trung tâm Y tế yêu cầu các bộ phận trực thuộc nghiêm túc triển khai, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở Y tế Kon Tum (b/c);
- Trung tâm KSBT tỉnh Kon Tum (b/c);
- Huyện ủy (b/c);
- Ủy ban nhân dân huyện (b/c);
- Lưu VT, KSBT.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Y Vũ