

# Ý KIẾN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG CHUYÊN MÔN NGHIỆM THU HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ BỆNH HEMOPHILIA

Họ và tên thành viên Hội đồng: TS. BS. Phú Chi' Dũng

Chức vụ: Giám Đốc / Ủy Viên Hội Đồng

Đơn vị công tác: BV Truyền Máu Huyết Học TP.HCM

## Nội dung nhận xét

- 1) Nên thông kết từ ngay đi vào danh sách bệnh nhân với hồ sơ cá nhân của bệnh nhân:
  - Đơn đặt hàng với sản phẩm theo số (đơn từ sản xuất)
  - Đơn từ bệnh nhân liên hệ bệnh nhân (đơn từ bệnh nhân)
  - Đơn từ Hemophilia có mặt để đi.
- 2) Ứng dụng các phần mềm, phần lý thuyết trên website?
- 3) Trong khi chờ đợi bệnh nhân, việc tiếp nhận đơn hàng (đơn đặt hàng) Hemophilia từ kết quả xét nghiệm và chuyển đơn. Để giúp cho việc điều trị và quản lý bệnh nhân có thể từ kết quả bệnh nhân từ từ công ty theo dõi bệnh nhân Hemophilia.
- 4) Xem thêm bệnh nhân kết quả y học bệnh Hemophilia với

~~397769268~~

## GÓP Ý DỰ THẢO HEMOPHILIA 2022

1. Xin xem lại con số ước tính quá cao? (với hàng 6000 người) (hàng 1000)
  2. Giảm hay bình thường
  3. Dự kháng thể *Trang họ tử 40 (mức độ kháng thể xuất hiện, chất ức chế)*
  4. Chất ức chế chỉ được kháng định khi ghi nhận có ít nhất 2 lần dương tính khác nhau, cách nhau 1-4 tuần
  5. Luôn luôn dưới 5 BU (mức: chất ức chế thấp)
  6. Có chị em ruột, chị em họ, con gái, cháu gái là người mang gen: *Trang họ tử 40 (mức độ kháng thể xuất hiện)*
  7. < 40% thì được xem là người mang gen có triệu chứng và phân loại độ nặng của bệnh tương tự như người bệnh hemophilia
  8. Bắt buộc phải làm thêm *(Trang họ tử 40 (mức độ kháng thể xuất hiện))*
  9. Nữ mang gen đang có thai giới tính nam *(phần đời sống của hàng đời sống)*
  10. Tỷ lệ sảy thai 0,5-1,3% *(thời gian phần đời sống xuất hiện đời sống)*
  11. Và vợ của người bệnh hemophilia muốn có con *(phần đời sống của hàng đời sống)*
  12. Hiện nay không còn dùng vì chứa ít YT VIII, dễ gây quá tải tuần hoàn *(phần đời sống của hàng đời sống)*
  13. Áp dụng đối với chảy máu nhẹ: 1 nhát/ 1 mũi (P < 50 kg), 2 nhát/ 1 mũi (P > 50 kg)
  14. Khuyến khích dùng Dexamethasone: Chỉ định Viêm khớp sau khi đã ngừng chảy máu: thời gian < 1 tuần với liều 0,05 mg/kg uống *(phần đời sống của hàng đời sống)*
  15. Các liệu kế tiếp sẽ giảm dần *3.10.10*
  16. Nếu không đủ điều kiện dùng APCC/rFVIIa thì xem xét giống 2.10.1.a., tuy nhiên lưu ý đáp ứng miễn dịch nhớ sau đó
  17. Bổ sung thêm Liều hd cho tiểu phẫu: Chọn 1 trong 2 chế phẩm rFVIIa/ APCC *(phần đời sống của hàng đời sống)*
    - rFVIIa:
      - o Liều tấn công 90 mcg/kg TM, trước phẫu thuật 30 phút
      - o Sau đó 90 mcg/kg mỗi 2 giờ, có thể lặp lại đến 4 lần
      - o Tiếp theo 90 mcg/kg mỗi 3 -6 giờ đến khi lành vết thương
    - APCC:
      - o Liều tấn công: 50-100 iu/kg TTM trước phẫu thuật 1 giờ
      - o Sau đó 50-75 iu/kg mỗi 8-12 giờ đến khi lành vết thương, tổng liều không quá 200 iu/kg/ngày
- Lưu ý: khoảng cách giữa các liều có thể dài hơn tùy tình trạng lâm sàng
18. Trong 3 ngày
  19. Giảm liều dần còn 50-75 iu/kg mỗi 8 giờ (tổng liều không quá 200 iu/kg/ngày) từ ngày 4 đến khi lành vết thương
  20. Chỉ có hiệu quả tạm thời
  21. Thời điểm bắt đầu lý tưởng là HGKT 5-10 BU hay khi có XH nặng đe dọa tính mạng, bất kể HGKT *(phần đời sống của hàng đời sống)*
  22. Kể từ tháng thứ 3 *(phần đời sống của hàng đời sống)*
  23. Bổ sung Đánh giá ITI thất bại ít nhất sau 9 tháng + Bổ sung tiêu chuẩn đánh giá thành công hoàn toàn, 1 phần, thất bại

24. ITI thành công thì dự phòng bằng YTĐM; ITI thất bại hay không làm ITI thì dự phòng  
 ?' bằng emicizumab, liều tham khảo 2.8.2. và 2.8.3

25. Hay phẫu thuật/thủ thuật

26. Hay  $\leq 16$  tuổi ???

27. Văn bản nào?

28. Cấp phát đủ cho 1 liệu điều trị sớm chảy máu TKTU (nặng nhất, tương đương 4 lần XH  
 cơ khớp), tham khảo bảng 2, mục 2.9

syt\_kontum\_vt\_So Y te Kon Tum\_29/01/2024 15:00

*(Handwritten notes in blue ink):*  
 (phần điều trị bằng chế độ  
 điều trị emicizumab)  
 (điều trị emicizumab)  
 tại I (II)

*[Handwritten signature]*

Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2022  
Thành viên nghiệm thu  
(Ký và ghi rõ họ tên)

syt\_kontum\_vt\_So Y te Kon Tum\_2024 15:13:02

- 
- 
- 

**Kết luận**  
 Đồng ý thông qua:  
 Không đồng ý thông qua  
 Ý kiến khác (ghi rõ)